

Bronchostad®

Hustenlöser

Tropfen 1,98 g/100 g
Flüssigkeit zum Einnehmen

Wirkstoff: Efeublätter - Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchostad® jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind oder wenn Sie Erfahrungen mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen gemacht haben, die schwerwiegend sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bronchostad® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchostad® beachten?
3. Wie ist Bronchostad® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchostad® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Bronchostad® und wofür wird es angewendet?

Bronchostad® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege

Bronchostad® wird angewendet

- zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen
- bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchostad® beachten?

Bronchostad® darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Efeublätter-Trockenextrakt oder einen der sonstigen Bestandteile von Bronchostad® sind
- von Kindern unter 1 Jahr.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchostad® ist erforderlich

Bei länger anhaltenden Beschwerden oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von Bronchostad® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen wurden nicht untersucht. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bronchostad® sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Bronchostad® einzunehmen?

Nehmen Sie Bronchostad® immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

für Kinder von 1-3 Jahren

3-mal täglich 7 Tropfen
(entsprechend 160 mg Efeublätter pro Tag).

für Kinder von 4-12 Jahren

3-mal täglich 10 Tropfen
(entsprechend 225 mg Efeublätter pro Tag).

für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre

3-mal täglich 12-15 Tropfen
(entsprechend 270-340 mg Efeublätter pro Tag).
10 Tropfen enthalten 0,58 g Flüssigkeit.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie die Tropfen bitte unverdünnt oder in etwas Wasser ein und trinken sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Bronchostad® zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Bronchostad® einnehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht länger als einige Tage ein (siehe: Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchostad® ist erforderlich).

Wenn Sie eine größere Menge Bronchostad® eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Verdacht auf eine Überdosierung benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die in Pkt. 4. aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchostad® vergessen haben

nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie vom Arzt oder in dieser Gebrauchsinformation beschrieben fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Bronchostad® Nebenwirkungen haben. Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Efeublätter-Trockenextrakt, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts

Gelegentlich: Bei empfindlichen Personen können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auftreten.

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten: Allergische Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Hautrötungen, Juckreiz).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bronchostad® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Nicht über +25°C lagern..

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Arzneimittel sollten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was Bronchostad® enthält

Der Wirkstoff ist Efeublätter-Trockenextrakt

100 g (= 107,8 ml) Flüssigkeit zum Einnehmen enthalten 1,98 g Trockenextrakt aus Efeublättern Ph. Fr. X in einem Verhältnis von Droge zu Extrakt wie (6,0-7,0:1). Das Auszugsmittel ist Ethanol 40% (m/m).

Die sonstigen Bestandteile sind

Acesulfam-Kalium, Maltodextrin, Povidon K30, Propylenglycol, Macrogol-glycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser, Kirsch-Aroma.

Wie Bronchostad® aussieht und Inhalt der Packung

Hellbraune dickflüssige Lösung
Bronchostad® ist in Packungen mit 20 ml Flüssigkeit zum Einnehmen erhältlich.

Zulassungsinhaber

STADA GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259

Internet: www.stada.de

Vertrieb

STADAvita GmbH

Königsteiner Straße 2

61350 Bad Homburg v. d. H.

Internet: www.stadavita.de

Hersteller

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2014.