



# Cefanorm®

Hartkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoff: Mönchspfefferfrüchte-Trockenextrakt

Apothekenpflichtig

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cefanorm® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Cefanorm®** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Cefanorm®** beachten?
3. Wie ist **Cefanorm®** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Cefanorm®** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. Was ist Cefanorm® und wofür wird es angewendet?

**Cefanorm® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Regelbeschwerden.**

### Anwendungsgebiete:

Rhythmusstörungen der Regelblutung (Regeltempoanomalien), Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie), monatlich wiederkehrende Beschwerden vor Eintritt der Regelblutung (prämenstruelle Beschwerden).

### Hinweis:

Bei Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten sowie bei Störungen der Regelblutung sollte zunächst ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Untersuchung bedürfen

## 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefanorm® beachten?

**Cefanorm® darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind,
- wenn Sie an Hypophysentumoren (Geschwülste der Hirnanhangsdrüse) leiden,
- wenn Sie an einem Mammakarzinom (Brustkrebs) leiden,
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefanorm® ist erforderlich:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

**Bei Einnahme von Cefanorm® mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkungen mancher Arzneimittel können durch gleichzeitige Anwendung anderer Mittel beeinflusst werden.

Da es Hinweise auf eine dopaminerge Wirkung von Mönchspfefferfrüchten gibt, könnte eine

wechselseitige Wirkungsabschwächung bei Gabe von Dopamin-Rezeptorantagonisten auftreten.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Cefanorm® darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden. Im Tierversuch wurde nach Einnahme von Mönchspfefferfrüchten eine Beeinträchtigung der Milchproduktion gesehen.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cefanorm®:

Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Lactose. Bitte nehmen Sie Cefanorm® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## 3. Wie ist Cefanorm® einzunehmen?

Nehmen Sie Cefanorm® immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Einmal täglich 1 Hartkapsel (entsprechend 40 mg Droge) einnehmen.

### Art der Anwendung:

Cefanorm®, Hartkapseln, mit Flüssigkeit (z.B. Wasser) schlucken.

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Cefanorm® soll möglichst immer zur gleichen Tageszeit eingenommen werden.

#### **Dauer der Anwendung:**

Für eine zuverlässige Wirkung sollte Cefanorm® über mindestens 3 Monatszyklen eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Cefanorm® eingenommen haben, als Sie sollten,**

benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt, dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Cefanorm® vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Cefanorm® abbrechen:**

Das Absetzen von Cefanorm® ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Cefanorm® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10  
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100  
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000  
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000  
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Gelegentlich können nach Einnahme von Cefanorm® Kopfschmerzen, Juckreiz oder abdominale Beschwerden wie Übelkeit, Magen- oder Unterbauchschmerzen auftreten sowie Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag und Quaddelsucht. Es wurden auch schwere

Reaktionen mit Gesichtsschwellung, Atemnot und Schluckbeschwerden beschrieben.

Insbesondere bei Anzeichen von Überempfindlichkeitsreaktionen beenden Sie bitte die Anwendung von Cefanorm® und suchen unverzüglich Ihren Arzt auf. Nach Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen darf Cefanorm® nicht nochmals angewendet werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **5. Wie ist Cefanorm® aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung und äußerer Umhüllung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **6. Weitere Informationen**

#### **Was Cefanorm® (Hartkapseln) enthalten:**

##### **Der Wirkstoff ist: 1 Hartkapsel enthält:**

4 mg Trockenextrakt aus Mönchspfefferfrüchten (7 – 13 : 1)

Auszugsmittel: Ethanol 60 % (m/m)

##### *Die sonstigen Bestandteile sind:*

Glucosesirup, Lactose-Monohydrat, Talkum, Maisstärke, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser, Farbstoff E 171.

##### **Hinweis für Diabetiker:**

1 Hartkapsel enthält 0,007 Broteinheiten (BE).

#### **Wie Cefanorm® aussieht und Inhalt der Packung:**

Hartgelatinesteckkapseln, weiß-opak, zum Einnehmen.

Packungsinhalt: Originalpackung mit 30 bzw. 60 bzw. 100 Hartkapseln.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Cefak KG

Postfach 1360, D-87403 Kempten

Telefon: 0831/57401-0

Telefax: 0831/57401-50

e-mail: cefak@cefak.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 04/2012



Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial - wir informieren Sie gerne!

#### **Cefak KG - Verbraucherservice**

Postfach 1360 · D-87403 Kempten · Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 · Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50  
e-mail: cefak@cefak.com